

生後2か月を過ぎたら

ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの 予防接種を受けましょう

ヒブワクチン

生後2～6か月に始めた場合

初回接種：1歳になるまでに27(医師が認めれば20)～56日あけて3回接種

初回が1歳になるまでに3回終わらなかったら...ヒブワクチンを最後に接種した日から27(医師が認めれば20)日以上あけて追加接種の1回をします。



追加接種：3回目から7～13カ月あけて1回接種

一般的な接種の仕方

初回接種 3回は1歳まで



小児用肺炎球菌ワクチン

生後2～6か月に始めた場合


初回接種：2歳になるまでに27日以上あけて3回接種



初回の2回目が1歳を過ぎて接種したら...3回目はやらないで追加接種へ
初回が2歳になるまでに終わらなかったら...小児用肺炎球菌ワクチンを最後に接種した日から60日以上あけて追加接種の1回をします

追加接種：1歳の誕生日以降に、3回目から60日以上あけて接種

一般的な接種の仕方



定期接種は4歳(5歳の誕生日前日)までです。7か月以降に接種を始める場合は、裏面をご覧ください。

ヒブワクチン

生後7～11か月に始めた場合

初回接種：1歳になるまでに2回（医師が認めれば2回）～56日あけて2回接種



初回接種が1歳になるまでに2回終わらなかったら...ヒブワクチンを最後に接種した日から27（医師が認めれば20）日以上あけて追加接種の1回をします。

追加接種：2回目から7～13カ月あけて1回接種

接種の仕方の例



1～4歳に初めて受ける場合は1回のみ接種します。

1～4歳 



小児用肺炎球菌ワクチン

生後7～11か月に始めた場合

初回接種：2歳になるまでに2回7日以上あけて2回接種

初回接種が2歳になるまでに終わらなかったら...小児用肺炎球菌ワクチンを最後に接種した日から60日以上あけて追加接種の1回をします




追加接種：1歳の誕生日以降に、2回目から60日以上あけて接種

接種の仕方の例



1歳～2歳になるまでに始めた場合



2～4歳で初めて接種する場合

